



RedVital
SALUD

INTOXICACIONES POR PRODUCTOS DEL HOGAR



Los productos del hogar son la primera causa de intoxicación por ingesta no intencionada en los menores de 2 años

Suelen producirse en niños menores de 3 o 4 años cuando están en su casa, especialmente en la cocina, donde por lo general se guardan estos productos



¿Cuáles son los síntomas?

- Aumento del babeo
- Vómitos
- Dolor de garganta
- Dificultad para tragar
- Rechazo al alimento
- Dificultad para respirar
- Dolor en pecho o tripa

¿Qué productos están implicados?

Lejías
Detergentes
Ambientadores
Insecticidas
Limpiasuelos
Pastillas para el lavavajillas



Prevención

Guardar los productos de limpieza inmediatamente después de utilizarlos

Guardar estos productos en lugares altos donde el niño/a no alcance y de difícil acceso para ellos

No dejar los productos de limpieza a la vista de los niños

No guardarlos en envases diferentes del original

Tener el menor número de productos de limpieza necesarios

Productos del hogar con tapón de seguridad



Tratamiento



- Conservar la tranquilidad
- No provocar el vómito
- Inicialmente, no es recomendable beber agua o leche
- Quitar la ropa que esté manchada con el producto tóxico
- En caso de contacto con los ojos o con la piel, lavar con abundante agua
- Conservar el producto responsable de la supuesta intoxicación para poder identificarlo posteriormente



En caso de duda, consultar por teléfono con el **Instituto Nacional de Toxicología (915620420)**, el **Servicio de Emergencias (112)** o un centro sanitario, quienes le indicarán la actuación inicial a seguir

