




Haushaltsprodukte sind die Hauptursache für unbeabsichtigte Vergiftungen durch Verschlucken bei Kinder unter 2 Jahren

Meistens geschieht dies bei Kindern unter 3 oder 4 Jahren, wenn sie Zuhause sind, vor allem in der Küche, wo diese Produkte normalerweise aufbewahrt werden



Welche Symptome treten auf?

- Speichelfluss
- Erbrechen
- Halsschmerzen
- Schluckbeschwerden
- Lebensmittellablehnung
- Atembeschwerden
- Brust- oder Bauchschmerzen

Vorbeugung

- Reinigungsmittel sofort nach dem Gebrauch aufbewahren
- Diese Produkte an hoch gelegenen Plätzen lagern, die für Kinder schwer zugänglich sind
- Reinigungsmittel außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren
- Nicht in anderen Verpackungen als den ursprünglichen aufbewahren
- Möglichst wenig Reinigungsmittel verwenden
- Haushaltsprodukte mit Sicherheitsverschluss benutzen



Behandlung



- Ruhe bewahren
- Kein Erbrechen auslösen
- Anfangs ist es nicht empfehlenswert, Wasser oder Milch zu trinken
- Die mit dem toxischen Produkt befleckte Kleidung ausziehen
- Bei Augen- oder Hautkontakt mit reichlich Wasser ausspülen
- Bewahren Sie das für die vermutete Vergiftung verantwortliche Produkt auf, so dass Sie es später leichter identifizieren können



Im Zweifelsfall wenden Sie sich telefonisch an das **Nationale Institut für Toxikologie (915620420)**, an den **Notdienst (112)** oder an ein **Gesundheitszentrum**, dass Ihnen die ersten zu ergreifenden Maßnahmen mitteilen wird